








Method for determination of antinuclear antibodies.**Publication number:** EP0453060**Publication date:** 1991-10-23**Inventor:** SCHOESSLER WERNER DR (DE); POHL WOLF-
DETLEF DR (DE); BUTSCHAK GUENTER DR (DE);
DITTRICH CHRISTA (DE)**Applicant:** IMTEC IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH (DE)**Classification:****- international:** **G01N33/564; G01N33/567; G01N33/564; G01N33/567;**
(IPC1-7): G01N33/547; G01N33/564**- european:** G01N33/564; G01N33/567**Application number:** EP19910250107 19910418**Priority number(s):** DD19900339884 19900419**Also published as:** EP0453060 (A3)
 EP0453060 (B1)**Cited documents:** EP0335293
 DD262672
 EP0206779
 DD241789
 US3997657**Report a data error here****Abstract of EP0453060**

The detection of antinuclear antibodies in body fluids is used to diagnose collagenoses and other rheumatic disorders. Indirect immunofluorescence is used as detection method, in which cryostat sections of rat liver or epithelial cell lines immobilised on slides are covered with patient's serum so that antinuclear antibodies which are present bind to the nuclear antigens. This immobilisation is elaborate and scarcely suitable for modern routine. The object of the present invention is therefore to immobilise isolated cell nuclei on a solid phase in order in this way to permit efficient determination of antinuclear antibodies in an immunoassay. This is achieved by covalent or adsorptive binding of isolated cell nuclei to chemically activated solid phases, especially polystyrene surfaces. The advantages of the method are the efficient determination of large numbers of samples under standardised conditions, associated with considerably lower costs in clinical practice.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

7

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 453 060 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **91250107.9**

(51) Int. Cl.⁵: **G01N 33/564, //G01N33/547**

(22) Anmeldetag: **18.04.91**

(30) Priorität: **19.04.90 DD 339884**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.10.91 Patentblatt 91/43

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE GB IT

(71) Anmelder: **IMTEC IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH**
Schönerlinder Strasse 11
O-1297 Zepernick(DE)

(72) Erfinder: **Schössler, Werner, Dr.**
Rathenaustrasse 12
O-1297 Neu-Buch(DE)
Erfinder: **Pohl, Wolf-Detlef, Dr.**
Friedrich-Richter-Strasse 47
O-1115 Berlin(DE)
Erfinder: **Butschak, Günter, Dr.**
Karl-Marx-Strasse 100
O-1280 Bernau(DE)
Erfinder: **Dittrich, Christa**
Theodor-Brugsch-Strasse 28
O-1115 Berlin(DE)

(54) Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern.

(57) Der Nachweis von antinukleären Antikörpern in Körperflüssigkeiten dient der Diagnose von Kollagenosen sowie von anderen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Als Nachweismethode ist die indirekte Immunfluoreszenz gebräuchlich, bei der auf Objektträger fixierte Kryostatschnitte von Rattenleber oder epitheliale Zelllinien mit Patientenserum überschichtet werden, so daß sich vorhandene antinukleäre Antikörper an die nukleären Antigene binden. Diese Fixierung ist aufwendig und zur modernen Routine kaum geeignet.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, isolierte Zellkerne an eine feste Phase zu fixieren, um damit eine effektive Bestimmung von antinukleären Antikörpern im Immunoassay zu ermöglichen. Die Lösung erfolgt durch kovalente oder adsorptive Bindung isolierter Zellkerne an chemisch aktivierte, feste Phasen insbesondere Polystyrenoberflächen.

Die Vorteile des Verfahrens liegen in der effektiven Bestimmung großer Probenzahlen unter standardisierten Bedingungen, verbunden mit wesentlich geringeren Kosten in der klinischen Praxis.

EP 0 453 060 A2

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur qualitativen und/oder quantitativen Bestimmung von antinukleären Antikörpern. Das Verfahren findet Anwendung in der pharmazeutischen Industrie, den Biowissenschaften und in der Medizin.

Antinukleäre Antikörper (ANA, ANF) sind Autoantikörper unterschiedlicher Spezifität, die gegen Zellkernantigene gerichtet sind. Der Nachweis von ANA ist besonders bedeutsam für die Diagnose von Kollagenosen, so vor allem des systemischen Lupus erythematoses und der mit dieser Erkrankung eng assoziierten "mixed connective tissue disease (MCTD)", sowie von anderen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises.

Als Methode der Wahl zum Nachweis von antinukleären Antikörpern ist die indirekte Immunfluoreszenz gebräuchlich, die neben der Bestimmung des Titers eine Bewertung des Musters der Kernantikörper gestattet. Allerdings ist diese Methode mit den Nachteilen des hohen Zeitaufwandes, der hohen Kosten sowie der stark eingeschränkten Objektivierbarkeit behaftet.

Das Prinzip der indirekten Immunfluoreszenz beruht darauf, daß auf Objektträger fixierte Kryostat-schnitte von Rattenleber (ca. 5 µm) oder epitheliale Zelllinien (HEp-Zellen) mit verdünntem Patientenserum überschichtet werden, so daß sich vorhandene antinukleäre Antikörper an die nukleären Antikörper binden. Die so gebundenen Antikörper werden durch ein FITC-markiertes Antihuman-Immunglobulin nachgewiesen und mit einem geeigneten Fluoreszenzmikroskop sichtbar gemacht. Die Präparation der Kryostat-schnitte von Rattenleber erfordert neben dem Aufwand der Tierhaltung eine kostenintensive Technik (Kryostat). Der Einsatz von Zellen ist an die kontinuierliche Züchtung derselben unter definierten und standardisierten Bedingungen gebunden und somit für die immunologische Routinediagnostik wenig geeignet. Dieser nicht unerhebliche Aufwand sowie die hiermit verbundenen Kosten limitieren die Zahl der Bestimmungen in der hochspezialisierten immunologischen Diagnostik, so daß diese den Anforderungen der Kliniken nicht mehr gerecht werden kann. Hinzu kommt, daß die Durchführung des Testes, die Beurteilung der Muster und die Interpretation der Befunde viel Erfahrung erfordern und somit dem Spezialisten vorbehalten sind. Besonders nachteilig sind die außerordentlich schwierige Standardisierbarkeit, die durch das zugrundeliegende Substrat sowie die eingesetzte Technik und Technologie determiniert wird, und die durch die visuelle Auswertung bedingte unzureichende Objektivierbarkeit. Es stellt sich daher die Aufgabe isolierte Zellkerne so an eine feste Phase zu fixieren, daß ein effektiver Einsatz zur Bestimmung antinukleärer Antikörper im Immunoassay ermöglicht wird.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch

gelöst, daß Zellkerne unterschiedlicher Herkunft, jedoch vorzugsweise aus Rattenleber, an feste Phasen adsorptiv oder kovalent gebunden werden, so daß diese zur spezifischen Bindung von antinukleären Antikörpern aus Körperflüssigkeiten im (Enzym-)Immunoassay eingesetzt werden. Hierzu wird die zu bestimmende Körperflüssigkeit, vorzugsweise Serum, in einer geeigneten Verdünnung mit den Zellkernen inkubiert, so daß sich vorhandene antinukleäre Antikörper an die Kernantigene der Zellkerne binden. Die so gebundenen Antikörper werden nunmehr mit einem markierten Anti-human-Antikörper nachgewiesen, wobei vorzugsweise Enzyme zur Markierung eingesetzt werden. Zellkerne aus Rattenleber kann man besonders vorteilhaft einsetzen, da diese die für die antinukleären Antikörper komplementären Kernantigene in hoher Konzentration und Dichte enthalten. Die Isolierung der Kernantigene erfolgt durch Dichtegradientenzentrifugation, so daß die antigenen Strukturen erhalten bleiben. Von großer Bedeutung ist, daß die so gewonnenen Zellkerne stabil und in hoher Dichte an die feste Phase, vorzugsweise Polystyren, gebunden werden, ohne daß sie ihre Struktur verändern. Der Zugang der antinukleären Antikörper ist dadurch sterisch kaum behindert. Dies ist vor allem durch die adsorptive oder kovalente Bindung der Kernantigene an zuvor chemisch aktiviertes Polystyren gegeben.

Der als feste Phase dienende Träger kann unterschiedliche geometrische Formen aufweisen, wobei die bekannten Mikrotitrationsplatten besonders geeignet sind. Einsetzbar sind auch Röhrchen, kugelförmige oder flächenförmige Träger. Die Bindung der antinukleären Antikörper erfolgt durch Inkubation des Serums in einer geeigneten Verdünnung mit den immobilisierten Zellkernen. Durch unterschiedliche Verdünnung des zu bestimmenden Serums ist eine Ermittlung des Titers und somit eine semiquantitative Bestimmung möglich. Eine quantitative Bestimmung ist bei Vorhandensein eines Standards prinzipiell möglich. Zur Unterdrückung unspezifischer Bindungen gestaltet sich der Einsatz von Puffern, die nichtionische oder ionische Detergentien, Inertproteine, wie Rinderserumalbumin, oder aber Serum anderer Spezies, wie Kälberserum, enthalten, als vorteilhaft.

Der Nachweis der gebundenen antinukleären Antikörper erfolgt durch spezifische enzymmarkierte Konjugate, die gegen humanes IgG, IgM oder IgA gerichtet sind. Für screening-Untersuchungen ist die gleichzeitige Erfassung aller Immunglobulin-klassen vorzuziehen. Als Enzyme kommen vorzugsweise die Peroxidase und alkalische Phosphatase in Betracht.

Besonders vorteilhaft und kostengünstig gestaltet sich das Verfahren durch Abspaltung der gebundenen antinukleären Antikörper (und somit auch des

Konjugates) mit nicht denaturierenden Medien, so daß die an der festen Phase (Polystyren) gebundenen Zellkerne funktionell regeneriert werden und erneut im Immuniassay eingesetzt werden können. Als nicht denaturierende Medien sind Lösungen mit hohen Ionenstärken, chaotropischen Agenzien, depolarisierende Reagenzien, elektrostatische und Wasserstoffbrückenbindungen beeinflussende Substanzen sowie Haptene oder aber Puffer mit hohen bzw. niedrigen pH-Werten einsetzbar.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens liegen vor allem in der effektiven Bestimmung großer Probenzahlen unter standardisierten Bedingungen, so daß den ständig wachsenden Anforderungen der klinischen Praxis entsprochen werden kann. Verbunden hiermit sind die wesentlich geringeren Kosten und der deutlich reduzierte Zeitaufwand des Verfahrens durch die objektiven Meßergebnisse und der damit verknüpften Möglichkeit der quantitativen Bestimmung der antinukleären Antikörper aus.

Von großer diagnostischer Relevanz ist die Differenzierbarkeit der ANA in unterschiedliche Immunglobulinklassen.

Die Erfindung wird im folgenden an Beispielen näher erläutert.

Beispiel 1

Die von jungen Ratten gewonnene Rattenleber wird in physiologischer Kochsalzlösung abgekühlt und mit einer Schere zerkleinert. Anschließend wird sie mit einem Glas-Teflon-Homogenisator nach Potter bei etwa 2000 Umdrehungen pro Minute mit 8 - 10 Hüben in dem zehnfachen Volumen eines 0,01 M Phosphat-Puffers, pH 7,4, der 0,005 M $MgCl_2$ und 0,25 M Saccharose enthält (Puffer A), homogenisiert. Nachfolgend wird mit dem Homogenat ein 0,01 M Phosphat-Puffer, pH 7,4, der 0,005 M $MgCl_2$ und 0,34 M Saccharose enthält (Puffer B), überschichtet und schließlich in einer Kühlzentrifuge 5 min bei 1000 g und 4°C zentrifugiert. Der Niederschlag wird im Ausgangsvolumen des Puffers A, der zusätzlich 1% Triton enthält, aufgenommen und nochmals zentrifugiert. Der Waschschrift wird zweimal wiederholt. Die Zellkerne werden in 2 ml eiskaltem 0,01 M Phosphat-Puffer aufgenommen und stehen für den Nachweis der antinukleären Antikörper zur Verfügung.

Beispiel 2

Die entsprechend Beispiel 1 isolierten Zellkerne werden mit einem 0,1 M Phosphat-Puffer, pH 8,0, auf eine Konzentration von ca. 500 eingestellt und in dieser Konzentration an chemisch aktivierte Polystyren-Mikrotestplatten über Nacht bei 4°C gebunden. Nach Entfernung der ungebundenen

Zellkerne durch dreimaliges Waschen mit einem PBS-Puffer, pH 7,4, der 0,05% Tween 20 (Waschpuffer) enthält, werden eventuell noch reaktive Gruppen mit PBS-Puffer, pH 7,4, der 5% Kälberserum enthält, durch zweistündige Inkubation bei 37°C geblockt. Nach erneutem Waschen mit o. g. Waschpuffer werden die zu bestimmenden Seren 1 : 50 in einem PBS-Puffer, pH 7,4, der 0,1% Tween 20 und 5% Kälberserum enthält, verdünnt und 2 h bei 37°C mit den immobilisierten Zellkernen inkubiert. Nach erneutem dreimaligen Waschen mit genanntem Waschpuffer werden die so gebundenen antinukleären Antikörper mit einem antihuman-IgG-Peroxidase-Konjugat und nachfolgender Bestimmung mit H_2O_2 und o-Phenylendiamin und abschließender photometrischer Messung bei 492 nm nachgewiesen.

Beispiel 3

Nach Beispiel 1 isolierte Zellkerne werden entsprechend Beispiel 2 an chemisch aktivierte Polystyren-Röhrchen gebunden, mit dem in Beispiel 2 angegebenen Puffer geblockt und anschließend mit den zu untersuchenden Seren in einer Verdünnung 1 : 50 in angegebenem Puffer inkubiert. Die so gebundenen antinukleären Antikörper werden nunmehr parallel mit einem anti-human-IgG-Peroxidase-Konjugat, anti-human-IgM-Peroxidase-Konjugat und anti-human-IgA-Peroxidase-Konjugat und nachfolgender Bestimmung der Enzymaktivität entsprechend Beispiel 2 nachgewiesen. Hierdurch werden antinukleäre Antikörper unterschiedlicher Immunglobulinklassen erfaßt.

Beispiel 4

Nach Beispiel 1 isolierte Zellkerne werden entsprechend Beispiel 2 an chemisch aktivierte Mikrotitrationsplatten gebunden und anschließend - wie in Beispiel 2 und 3 angegeben - geblockt und mit den zu bestimmenden Seren inkubiert. Der Nachweis der antinukleären Antikörper erfolgt mit einem trivalenten Konjugat, das humanes IgG, IgM und IgA erfaßt, und Bestimmung der Enzymaktivität entsprechend Beispiel 2. Dieses Verfahren ist vor allem für screening-Untersuchungen empfehlenswert.

Beispiel 5

Im Anschluß an die Durchführung des Immunoassays entsprechend den Beispielen 2 - 4 werden die Polystyren-Träger mit 1 M Kaliumthiocyanatlösung für 1 h bei Raumtemperatur inkubiert und somit die kovalent gebundenen Zellkerne funktionell regeneriert, so daß sie für einen erneuten

Einsatz entsprechend den Beispielen 2 - 4 zur Verfügung stehen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern aus Körperflüssigkeiten, gekennzeichnet dadurch, daß Zellkerne unterschiedlicher Herkunft, jedoch vorzugsweise aus Rattenleber, an feste Phasen adsorptiv oder kovalent gebunden und nachfolgend zur spezifischen Bindung und zum Nachweis der antinukleären Antikörper im Immunoassay eingesetzt werden.
2. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß die Bindung der Zellkerne an zuvor chemisch aktiviertes Polystyren erfolgt.
3. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß die feste Phase eine unterschiedliche geometrische Form hat.
4. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 - 3, gekennzeichnet dadurch, daß die als feste Phase dienenden Träger in Form einer Mikrotitrationsplatte oder eines Röhrchens vorliegen oder aber eine kugelförmige oder flächenförmige Gestalt haben.
5. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 - 4, gekennzeichnet dadurch, daß die Zellkerne durch Dichtegradientenzentrifugation isoliert werden.
6. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 - 5, gekennzeichnet dadurch, daß die antinukleären Antikörper spezifisch an die immobilisierten Zellkerne gebunden und im Immunoassay bestimmt werden.
7. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 - 6, gekennzeichnet dadurch, daß die Bindung der antinukleären Antikörper in geeigneten Puffern, die nicht-ionische oder ionische Detergenzien oder Proteine enthalten, erfolgt.
8. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 - 7, gekennzeichnet dadurch, daß die gebundenen antinukleären Antikörper durch spezifische enzymmarkierte Konjugate, die gegen einzelne Immunglobulinklassen oder aber gegen mehrere ge-

richtet sind, nachgewiesen werden.

9. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 - 8, gekennzeichnet dadurch, daß nach Ablauf des Immunoassays die immobilisierten Zellkerne durch nicht denaturierende Medien funktionell regeneriert werden und somit erneut im Immunoassay eingesetzt werden können.
10. Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern nach Anspruch 1 - 9, gekennzeichnet dadurch, daß die nicht denaturierenden Medien Lösungen mit hohen Ionenstärken, chaotropischen Agenzien, mit depolarisierenden Reagenzien, elektrostatische und Wasserstoffbrückenbindungen beeinflussende Substanzen sowie mit Haptene oder hohen bzw. niedrigen pH-Werten sind.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 453 060 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 91250107.9

(51) Int. Cl.⁵: **G01N 33/564, //G01N33/547**

(22) Anmeldetag: 18.04.91

(30) Priorität: 19.04.90 DD 339884

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.10.91 Patentblatt 91/43

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE GB IT

(88) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 27.11.91 Patentblatt 91/48

(71) Anmelder: IMTEC IMMUNDIAGNOSTIKA GMBH
Schönerlinder Strasse 11
O-1297 Zepernick(DE)

(72) Erfinder: Schössler, Werner, Dr.
Rathenaustrasse 12
O-1297 Neu-Buch(DE)
Erfinder: Pohl, Wolf-Detlef, Dr.
Friedrich-Richter-Strasse 47
O-1115 Berlin(DE)
Erfinder: Butschak, Günter, Dr.
Karl-Marx-Strasse 100
O-1280 Bernau(DE)
Erfinder: Ditttrich, Christa
Theodor-Brugsch-Strasse 28
O-1115 Berlin(DE)

(54) Verfahren zur Bestimmung von antinukleären Antikörpern.

(57) Der Nachweis von antinukleären Antikörpern in Körperflüssigkeiten dient der Diagnose von Kollagenosen sowie von anderen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, isolierte Zellkerne an eine feste Phase zu fixieren, um damit eine effektive Bestimmung von antinukleären Antikörpern im Immunoassay zu ermöglichen. Die Lösung erfolgt durch kovalente oder adsorptive Bindung isolierter Zellkerne an chemisch aktivierte, feste Phasen insbesondere Polystyrenoberflächen.

Die Vorteile des Verfahrens liegen in der effektiven Bestimmung großer Probenzahlen unter standardisierten Bedingungen, verbunden mit wesentlich geringeren Kosten in der klinischen Praxis.

EP 0 453 060 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 25 0107

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X,Y	EP-A-0 335 293 (HOECHST JAPAN LIMITED) * das ganze Dokument * - - - -	1-8,9-10	G 01 N 33/564 // G 01 N 33/547
Y	DD-A-2 626 72 (AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER DDR) * Seite 2 * - - - -	9-10	
X	EP-A-0 206 779 (MODERN DIAGNOSTICS, INC.) * das ganze Dokument * - - - -	1,3-8	
A	DD-A-2 417 89 (HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN) * Anspruch 6 * - - - -	9-10	
A	Journal of Immunological Methods vol. 35, 1980, Seiten 285 - 296; R.M. Hendry et al.: "Immobilization of antibodies on nylon for use in enzyme-linked immunoassay" * Seite 291 * - - - -	9-10	
A	US-A-3 997 657 (DZIOBKOWSKI ET AL.) * Zusammenfassung * - - - - -	1,3,4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			G 01 N
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Berlin		18 September 91	CEDER H O
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: mündliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			